

Жалобы на одышку смешанного характера во время физической нагрузки, преимущественно в вечерние время.

Анамнез: СД 1 типа больше 15 лет. Получает левимир, новорапид.

Соматический статус: Состояние удовлетворительное. Кожные покровы чистые, сухие, t 36.6 С. Лимфатические узлы не изменены. Питание удовлетворительное вес 48 кг рост 158 ИМТ 19. В легких дыхание жесткое, хрипы нет, ЧДД 17 в минуту. Тоны сердца приглушены, ритмичные. АД 120/80 мм. рт. ст, ЧСС 60. Перкуторно границы сердца в норме. Живот мягкий, безболезненный. Печень по краю реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Стул в норме. Мочевыпускание не нарушено.

DS: СД 1 типа, целевой уровень HbA1C < 8,0%. Диабетическая полинейропатия, ангиопатия сетчатки. Диабетическая нефропатия в стадии протеинурии. Артериальная гипертензия 3 степени 3 стадии риск 4 ХСН I ФК I

34 006 966

Т. Амодиазон 5 мг по 1 шт. 3 раза в сутки



Врач: Батыров Е. М.

Ф. Амлодипин 5 мг по 1 шт. 1 раз в сутки

Ирсулин ВК Витамин гидрокальцидот, в СД I тип.

Мабе-м-сен каррпан в стадии протеинурии  
Иванова Мария Ивановна